

EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES p -ADIQUES ET SÉRIES GEVREY ARITHMÉTIQUES

SAID MANJRA ET SALAH-EDDINE REMMAL

1. INTRODUCTION

Cet article est consacré à une étude p -adique de l'équation différentielle algébrique de degré minimal annulant une série Gevrey arithmétique d'ordre -1 (c'est-à-dire, une E -fonction). Plus précisément, on y démontre une conjecture d'Yves André (conjecture 4.7 de [A2]).

Fixons d'abord quelques notations. Soit K un corps de nombres et soit V_0 l'ensemble de toutes les places finies v de K . Pour chaque $v \in V_0$ au-dessus d'un nombre premier $p = p(v)$, on normalise la valeur absolue v -adique de façon que $|p|_v = p^{-1}$ et on note $\pi_v = p^{\frac{-1}{p-1}}$. On désigne aussi par K_v le complété de K pour cette valeur absolue, et on fixe un plongement $K \hookrightarrow \mathbb{C}$. Pour tout réel $r > 0$, le *rayon de convergence générique* $R_v(\phi, r)$ d'un opérateur différentiel $\phi \in K[x, d/dx]$ est, par définition, le rayon de convergence, limité supérieurement par r , d'une base de solutions de ϕ au voisinage d'un point générique v -adique de valeur absolue r .

Une série formelle $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est dite *série Gevrey arithmétique* d'ordre $s \in \mathbb{Q}$ si ses coefficients a_n sont des nombres algébriques et s'il existe une constante $C > 0$ telle que les conjugués du nombre algébrique $a_n/(n!)^s$ soient de valeur absolue inférieure à C^n , et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le dénominateur commun d_n des nombres $a_0 = a_0/(0!)^s, \dots, a_n/(n!)^s$ soit inférieur à C^n . Cette classe englobe les séries hypergéométriques généralisées confluentes ou non, à paramètres rationnels. L'ensemble de telles séries est noté $\overline{\mathbb{Q}}\{x\}_s$. Une série formelle à coefficients algébriques est dite holonome si elle est solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients dans $\overline{\mathbb{Q}}(x)$. Les G -fonctions (resp. les E -fonctions) sont par définition les éléments holonomes de $\overline{\mathbb{Q}}\{x\}_0$ (resp. de $\overline{\mathbb{Q}}\{x\}_{-1}$).

La théorie des G -fonctions a connu un essor remarquable au cours des dernières décennies, principalement grâce aux travaux de Chudnovsky, Bombieri et André. Leurs contributions ont mis en évidence certaines connexions avec la transcendance et la géométrie arithmétique.

1991 *Mathematics Subject Classification.* 12H25, 13N10.

Travail partiellement subventionné par le CRSNG.

En particulier, Chudnovsky a prouvé que l'opérateur différentiel ϕ de $K[x, d/dx]$ d'ordre minimal (en d/dx) annulant une G -fonction satisfait la condition dite de Galochkin (cf. [CC], [A1, VI]). Un opérateur différentiel de $K[x, d/dx]$ qui remplit cette condition est appelé un G -opérateur. André, plus tard, a établi l'équivalence entre cette condition et celle de Bombieri, à savoir qu'un opérateur différentiel ϕ de $K[x, d/dx]$ est un G -opérateur si et seulement s'il satisfait $\prod_{v \in V_0} R_v(\phi, 1) \neq 0$ [A1, IV 5.2]. Grâce au théorème de Katz [Ka, 13.0], on vérifie que les G -opérateurs n'ont que des singularités régulières à exposants rationnels. De plus, toutes les séries formelles qui interviennent dans leurs solutions, en tout point fini ou infini, sont des G -fonctions [A1, V].

L'étude des séries Gevrey arithmétiques d'ordre non nul holonomes a été récemment développée par Y. André dans [A2]. En particulier, ce dernier a introduit une nouvelle classe d'opérateurs différentiels appelés E -opérateurs. Par définition, un E -opérateur est la transformée de Fourier-Laplace d'un G -opérateur. Cette appellation est justifiée par le fait que l'opérateur différentiel de degré minimal en x de $K[x, d/dx]$ annulant une E -fonction est la transformée de Fourier-Laplace d'un G -opérateur [A2, 4.2]. Également, les séries formelles qui interviennent dans les solutions en 0 d'un E -opérateur sont toutes des E -fonctions [A2, 4.3]. L'importance de ces opérateurs vient du fait que, si $y \in \overline{\mathbb{Q}}\{x\}_s$ pour un certain rationnel s non nul, alors $y(x^{-s})$ est solution d'un E -opérateur ψ [A2, 6.1]. Un tel résultat, combiné aux propriétés de ces opérateurs, fournit une bonne connaissance des propriétés de l'opérateur d'ordre minimal annulant un élément de $\overline{\mathbb{Q}}\{x\}_{s \neq 0}$ (Théorème de dualité [A2]). Ces résultats permettent, en particulier, de retrouver certains théorèmes fondamentaux de la théorie de transcendance: *théorème de Lindemann-Weierstrass* et *théorème de Siegel-Shidlovskii* [A3]. André a aussi conjecturé une caractérisation p -adique des E -opérateurs analogue à celle de Bombieri pour les G -opérateurs [A2, 4.7]. En réponse à cette conjecture, nous démontrons ici le résultat suivant:

Théorème 1.1. *Soit $\psi \in K[x, d/dx]$. Alors ψ est un E -opérateur si et seulement si les conditions suivantes sont satisfaites:*

- (1) *les pentes du polygone de Newton (au sens de Ramis) de ψ sont dans $\{-1, 0\}$,*
- (2) $\prod_{v \in V_0} R_v(\psi, \pi_v) \pi_v^{-1} \neq 0$.

Notons que la conjecture précise d'André remplace la condition (1) par la condition plus faible que ϕ n'ait de singularités qu'en 0 et en l'infini. Cependant, on verra par un exemple que ceci ne suffit pas et qu'il y faut la condition plus forte que nous donnons sur le polygone

de Newton-Ramis (voir l'exemple 4.6).

La démonstration de ce théorème est basée essentiellement sur les propriétés locales des G -opérateurs (Corollaire 3.2.1) par le biais d'une transformée de Laplace formelle (nouvelle) et d'une généralisation du principe de transfert de Christol [MR] combinés à quelques propriétés du polygone de Newton-Ramis.

Cet article est organisé ainsi:

La section 2 est consacrée aux notations et résultats préliminaires. En particulier, on y donne un critère arithmétique local pour la rationalité des exposants (Corollaire 2.3.3), et on y établit l'équivalence entre conditions “Bombieri” et “local Bombieri” dans un cadre plus général (Théorème 2.4.2). On définit ensuite le polygone de Newton au sens de Ramis et on cite certaines de ses propriétés (§2.5). On définit aussi une transformée de Fourier-Laplace généralisée qui étend à la fois la transformée de Fourier-Laplace usuelle et celle de Dwork normalisée (§2.6). Dans la section 3, on rappelle quelques propriétés des G -opérateurs et E -opérateurs. Puis, dans la section 4, on démontre une première moitié du théorème 1.1, à savoir que les conditions (1) et (2) de ce théorème sont nécessaires. On introduit, dans la section 5, une transformation de Laplace formelle généralisée $\mathcal{L}_\Lambda^\tau$, par rapport à une matrice Λ carrée $n \times n$ à coefficients dans un corps de nombres K et à un nombre algébrique $\tau \in K$, agissant sur les matrices de la forme de $A(x)x^\Lambda$, où $A(x)$ est une matrice $m \times n$ à coefficients dans $K[[x, 1/x]]$. Cette transformation satisfait des propriétés de commutation avec la dérivation d/dx et avec la transformée de Fourier-Laplace généralisée qui sont analogues au cas classique (Proposition 5.1). De plus on démontre des relations de comparaison entre les rayons de convergence des coefficients de $A(x)x^\Lambda$ et ceux de son image $\mathcal{L}_\Lambda^\tau(A(x)x^\Lambda)$ (Proposition 5.2.2). On combine tous ces outils dans la section 6 pour compléter la démonstration du théorème 1.1.

Remerciements. *Nous tenons à remercier G. Christol pour son soutien, D. Roy pour ses suggestions dans la présentation du §5 et Y. André pour ses remarques.*

2. NOTATIONS ET RÉSULTATS ÉLÉMENTAIRES

2.1 Modules différentiels

Soit $\mathcal{K}$ un corps commutatif muni d'une dérivation ∂ , soit K le corps des constantes de ∂ dans $\mathcal{K}$ et soit $n \geq 1$ un entier. Un $\mathcal{K}$ -module différentiel $\mathcal{M}$ est un module libre de rang n

sur $\mathcal{K}$ muni d'un K -endomorphisme ∇ de $\mathcal{M}$ qui vérifie pour tout $m \in \mathcal{M}$ et tout $a \in \mathcal{K}$ la condition $\nabla(am) = a\nabla(m) + \partial(a)m$. A chaque base $\{e_i\}$ de $\mathcal{M}$ sur $\mathcal{K}$ correspond une matrice $A = (A_{ij}) \in M_n(\mathcal{K})$ vérifiant

$$\nabla(e_i) = \sum_{j=1}^n A_{ij} e_j$$

appelée représentation de la dérivation ∂ dans la base $\{e_i\}$ (ou simplement matrice associée à $\mathcal{M}$) ainsi qu'un système différentiel $\partial X = AX$ où X désigne un vecteur colonne $n \times 1$ ou encore une matrice $n \times n$. Un changement de base dans $\mathcal{M}$ se traduit par la donnée d'une matrice $Y \in \text{GL}_n(\mathcal{K})$ telle que $Y[A] := YAY^{-1} + \partial(Y)Y^{-1}$ soit la représentation de ∂ dans la nouvelle base. La donnée de $\mathcal{M}$ correspond aussi à celle d'une équation différentielle linéaire via le lemme du vecteur cyclique (cf. [Ma, III]).

Inversément, si on dispose d'un opérateur différentiel $\phi = \sum_{i=0}^n a_i \partial^i \in \mathcal{K}[\partial]$ avec $a_n \neq 0$, on peut lui associer le $\mathcal{K}$ -module différentiel $\mathcal{M}_\phi = \mathcal{K}[\partial]/\mathcal{K}[\partial]\phi$ de rang n qui correspond au système

$$\partial X = A_\phi X \quad \text{où} \quad A_\phi := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\frac{a_0}{a_n} & \frac{a_1}{a_n} & -\frac{a_2}{a_n} & \dots & -\frac{a_{n-1}}{a_n} \end{pmatrix}.$$

On associe aussi à ϕ l'opérateur adjoint $\phi^* = \sum_{i=0}^n (-\partial)^i a_i$. On vérifie que $-{}^t A_\phi$ est associée à $\mathcal{M}_{\phi^*} = \mathcal{K}[\partial]/\mathcal{K}[\partial]\phi^*$. Plus généralement, A est une matrice associée à $\mathcal{M}_\phi = \mathcal{K}[\partial]/\mathcal{K}[\partial]\phi$, si et seulement si $-{}^t A$ est associée à $\mathcal{M}_{\phi^*}$. Ceci résulte du fait que pour tout $Y \in \text{GL}_n(\mathcal{K})$, on a

$$\begin{aligned} -{}^t(Y[A_\phi]) &= {}^t Y^{-1}(-{}^t A_\phi){}^t Y - {}^t Y^{-1} \partial({}^t Y) = {}^t Y^{-1}(-{}^t A_\phi){}^t Y + \partial({}^t Y^{-1}){}^t Y \\ &= ({}^t Y^{-1})[-{}^t A_\phi]. \end{aligned}$$

Soient $A_1, \dots, A_\ell$ des matrices carrées à coefficients dans $\mathcal{K}$. On note par $\mathcal{M}_{A_i}$ le module différentiel associé à la matrice A_i pour $i = 1, \dots, \ell$, et par $\oplus_{1 \leq i \leq \ell} A_i$ la matrice diagonale par blocs

$$\oplus_{1 \leq i \leq \ell} A_i = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_\ell \end{pmatrix}$$

avec les blocs $A_1, \dots, A_\ell$ sur la diagonale. De façon similaire, on définit $\oplus_{1 \leq i \leq \ell} \mathcal{M}_{A_i} := \mathcal{M}_{\oplus_{1 \leq i \leq \ell} A_i}$. Si $A_1, \dots, A_\ell \in M_n(\mathcal{K})$, on pose $\otimes_{1 \leq i \leq \ell} \mathcal{M}_{A_i} := \mathcal{M}_{A_1 + \dots + A_\ell}$. On notera par $\mathbb{I}_n$ la

matrice identité de $M_n(\mathcal{K})$.

2.2 Rayon de convergence au voisinage d'une singularité

On considère le corps différentiel $\mathcal{K} = K(x)$ muni de la dérivation $\partial = d/dx$. Soit $\mathcal{M}$ le $K(x)$ -module différentiel de rang n associé à une matrice $A(x)$ à coefficients dans $K(x)$. On dit que $\mathcal{M}$ est régulier en 0, s'il existe une extension finie K' de K , une matrice $Y_A(x) \in \mathrm{GL}_n(K'((x)))$, appelée *matrice de réduction* de $A(x)$ (ou de $\mathcal{M}$) en 0 et une matrice $\Gamma \in M_n(K')$ telles que $Y_A(x)[A(x)] = \Gamma/x$. Dans ce cas, $Y_A(x)^{-1}x^\Gamma$ est solution du système $dX/dx = A(x)X$. On vérifie que les valeurs propres de Γ modulo $\mathbb{Z}$ ne dépendent que de $\mathcal{M}$. On les appelle les *exposants* de $\mathcal{M}$ en 0. Quitte à faire un changement de bases dans $\mathcal{M}$, on peut supposer que la matrice Γ est sous forme de Jordan.

En particulier, si $A(x) = A_\phi$ pour un opérateur différentiel ϕ de $K(x)[\partial]$, la matrice $Y_A(x)$ sera notée Y_ϕ et appelée matrice de réduction de ϕ .

On dit que $\mathcal{M}$ est régulier en l'infini, si le $K(x)$ -module $\mathcal{M}^\infty$ obtenu à partir de $\mathcal{M}$ par le changement de variable $x \longrightarrow 1/x$ est régulier en 0. Cela signifie qu'il existe une extension finie K' de K , une matrice $Y_\infty(x) \in \mathrm{GL}_n(K'((x)))$, appelée matrice de réduction de A (ou de $\mathcal{M}$) en l'infini et une matrice $\Gamma_\infty \in M_n(K')$ telles que $Y_\infty(x^{-1})[A(x)] = -\Gamma_\infty/x$. Les exposants de $\mathcal{M}$ en l'infini sont les valeurs propres de Γ_∞ modulo $\mathbb{Z}$. Dans ce cas, $Y_\infty(x^{-1})(x^{-1})^{\Gamma_\infty}$ est solution du système $dX/dx = A(x)X$.

Soit $\phi \in K(x)[\partial]$. Par extension, on attribuera à ϕ les propriétés que $\mathcal{M}_\phi$ possède. On constate alors, depuis §2.1, que ϕ est régulier en 0 (resp. l'infini) si et seulement si ϕ^* est régulier au même point, auquel cas, les exposants de ϕ^* en 0 (resp. en l'infini) sont les mêmes que ceux de ϕ mais de signes opposés.

On désignera par $\bar{\phi}$ l'opérateur différentiel obtenu à partir de ϕ par le changement de variable $x \longrightarrow -x$ et par $\mathcal{M}_\alpha$ le $K(x)$ -module différentiel (régulier en 0) associé à l'équation $xd/dx - \alpha$ où α est un élément de K .

Dans la suite, on pourra toujours supposer K suffisamment grand de sorte qu'on puisse prendre $K' = K$. On fixera pour toute place finie v de V_0 , un plongement $K \hookrightarrow K_v \hookrightarrow \mathbb{C}_{p(v)} \hookrightarrow \Omega_{p(v)}$, où $\Omega_{p(v)}$ est une extension de $\mathbb{C}_{p(v)}$ valuée complète et algébriquement close, dont le groupe des valeurs absolues est $\mathbb{R}_{\geq 0}$ et dont le corps résiduel est une extension stricte du corps résiduel $\mathbb{F}_{p(v)^\infty}$ de $\mathbb{C}_{p(v)}$. Pour tout réel $r > 0$, on notera par $t_{v,r}$ un point générique

dans $\Omega_{p(v)}$ de valeur absolue r . On notera par S l'ensemble de tout les nombres premiers de $\mathbb{Z}_{>0}$. On dira qu'une propriété est vérifiée pour presque tout v , si elle est vérifiée pour tout $v \in V_0$ excepté peut-être pour un nombre fini de v .

Soient maintenant v une place finie fixée de V_0 et I un intervalle de $\mathbb{R}_{>0}$. On notera par $\mathcal{A}_v(I)$ l'anneau des fonctions analytiques dans la couronne $\mathcal{C}_v(I) := \{a \in \mathbb{C}_{p(v)} \mid |a|_v \in I\}$:

$$\mathcal{A}_v(I) = \left\{ \sum_{i \in \mathbb{Z}} a_i x^i \in \mathbb{C}_{p(v)}[[x, 1/x]] \mid \lim_{i \rightarrow \mp \infty} |a_i|_v r^i = 0, \forall r \in I \right\},$$

et par $\mathcal{H}_v(I)$ le complété de l'anneau des fractions rationnelles f de $\mathbb{C}_{p(v)}(x)$ n'ayant pas de pôle dans $\mathcal{C}_v(I)$ pour la norme $\|f\|_{v,I} := \sup_{r \in I} |f(t_{v,r})|_v$. On sait que $\mathcal{H}_v(I) \subseteq \mathcal{A}_v(I)$, avec égalité si I est fermé.

Si $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ et $Y \in M_n(K((x)))$, on pose, s'il existe, $r_v(Y) := \sup\{r > 0 \mid Y \in M_n(\mathcal{A}_v(]0, r[))\}$, et $R_v(Y) := \min(r_v(Y), r_v(Y^{-1}))$ si en plus $Y \in GL_n(K((x)))$. Cette dernière notation est justifiée par le résultat suivant de F. Baldassarri [Ba, III].

Proposition 2.2.1. *Si $Y(x)$ est une matrice de réduction d'un $K(x)$ -module $\mathcal{M}$ en 0 ou en l'infini, alors $R_v(Y)$ est non nul.*

Le symbole de Pochhammer $(\alpha)_i$ est défini pour tout $\alpha \in K$ et tout entier $i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ par $(\alpha)_0 = 1$ et $(\alpha)_i = \alpha(\alpha + 1) \dots (\alpha + i - 1)$ pour $i > 0$. Avec cette notation, le théorème 2 de [Cl] donne aussitôt:

Lemme 2.2.2. *Soit v une place finie de K . Pour tout entier $\alpha \geq 1$ ou tout nombre rationnel α non entier de dénominateur premier à $p(v)$, on a $\lim_{i \rightarrow \infty} |(\alpha)_i|_v^{1/i} = \pi_v$. En particulier, si $\alpha = 1$, on a $\lim_{i \rightarrow \infty} |i!|_v^{1/i} = \pi_v$.*

2.3 Rayon de convergence générique

Soient n un entier positif, v une place finie de V_0 , I un intervalle de $\mathbb{R}_{>0}$ et A une matrice $n \times n$ à coefficients dans $\mathcal{H}_v(I)$. Pour tout réel r de $\bar{I}$ (l'adhérence de I dans $\mathbb{R}_{>0}$), le rayon de convergence générique $R_v(\mathcal{M}_A, r)$ du module différentiel $\mathcal{M}_A$ associé à A est, par définition, le rayon de convergence, limité supérieurement par r , d'une solution $\mathcal{U}_{t_{v,r}}$ de $GL_n(\Omega_{p(v)}[[x - t_{v,r}]])$ du système $dU/dx = AU$ au voisinage du point générique $t_{v,r}$. D'après [CR, 9.2.7], si $Y \in GL_n(\mathcal{H}_v(I))$, on a pour tout r de I

$$(2.1) \quad R_v(\mathcal{M}_{Y[A]}, r) = R_v(\mathcal{M}_A, r).$$

Du fait qu'on a pour tout sous-intervalle fermé non vide J de I , $\mathcal{H}_v(J) = \mathcal{A}_v(J)$, la définition du rayon de convergence générique ci-dessus et l'égalité (2.1) s'étendent, pour tout $r \in I$, au cas où $A \in M_n(\mathcal{A}_v(I))$, $Y \in GL_n(\mathcal{A}_v(I))$.

Supposons dorénavant que $A \in M_n(K(x))$. On déduit du théorème 2 de [Po] que le graphe de la fonction $\rho \mapsto \log(R_v(\mathcal{M}_A, \exp(\rho)))$ est un polygone, ayant un nombre fini de côtés à pentes rationnelles, appelé *polygone de convergence* de $\mathcal{M}_A$, sur $\mathbb{R}$ que l'on note par $\mathcal{P}_v$. En particulier, si $A \in M_n(\mathcal{H}_v(I))$, alors la partie de $\mathcal{P}_v$ au-dessus de l'intervalle $\log(\bar{I}) := \{\log(\rho) \mid \rho \in \bar{I}\}$ est concave. De plus, si $A = A_\phi$ pour un certain opérateur différentiel ϕ de $K(x)[d/dx]$, on vérifie que les deux fonctions $R_v(\mathcal{M}_\phi, \cdot)$ et $R_v(\phi, \cdot)$ coïncident sur $\mathbb{R}_{>0}$. Le polygone $\mathcal{P}_v$ de $\mathcal{M}_\phi$ est alors dit aussi polygone de convergence de ϕ .

Théorème 2.3.1 (de finitude) [MR, 3.1]. *L'ensemble des pentes des polygones de convergence d'un opérateur différentiel ϕ de $K(x)[d/dx]$, associés aux différentes places finies de K , est fini.*

Ce théorème jouera un rôle essentiel dans la sous-section suivante et par conséquent dans la démonstration du résultat principal du présent article.

Supposons toujours que $A \in M_n(K(x))$ et $v \in V_0$. Si r est un réel > 0 et $\mathcal{U}_{t_{v,r}}$ est une solution du système $dU/dx = AU$ au voisinage de $t_{v,r}$, alors le rayon de convergence de $\mathcal{U}_{t_{v,r}}^{-1}$ est supérieur ou égale à $R_v(\mathcal{M}_A, \rho)$ (cf. [CR, 9.2.5]). En combinant cette remarque avec le fait que, si B est une fraction rationnelle de $K(x)$ et $\mathcal{V}_{t_{v,r}}$ est une solution du système $dV/dx = BV$ au voisinage de $t_{v,r}$, alors le produit $\mathcal{U}_{t_{v,r}}\mathcal{V}_{t_{v,r}}$ est une solution du système $dW/dx = (B\mathbb{I}_n + A)W$ au voisinage de $t_{v,r}$, on trouve que pour tout $r > 0$,

(2.2)

$$R_v(\mathcal{M}_A \otimes \mathcal{M}_B, r) \geq \min\{R_v(\mathcal{M}_A, r), R_v(\mathcal{M}_B, r)\}, \text{ avec égalité si } R_v(\mathcal{M}_A, r) \neq R_v(\mathcal{M}_B, r).$$

Par ailleurs, il est facile de voir que, si B est une matrice carrée à coefficients dans $K(x)$, on a pour tout $r > 0$,

$$(2.3) \quad R_v(\mathcal{M}_A \oplus \mathcal{M}_B, r) = \min\{R_v(\mathcal{M}_A, r), R_v(\mathcal{M}_B, r)\}.$$

Si en particulier, A est une matrice triangulaire supérieure nilpotente à coefficients dans K , on déduit du principe de transfert de Christol ([Ch, 1.1]) que pour tout $r > 0$,

$$(2.4) \quad R_v(\mathcal{M}_{(A/x)}, r) = r.$$

Lemme 2.3.2. *Soient n un entier positif, A une matrice $n \times n$ à coefficients dans $K(x)$. Supposons que $\mathcal{M}_A$ est régulier en 0 avec au moins un exposant irrationnel. Alors l'ensemble*

$\{p \in S \mid \exists v \in V_0, v|p, \forall 0 < r \leq 1, R_v(\mathcal{M}_A, r) \leq r\pi_v\}$ a une densité de Dirichlet positive.

Preuve. Soient $\alpha \in K$ et $r > 0$. Alors la solution $\mathcal{U}_{t_{v,r}}$ de $dU/dx = (\alpha/x)U$ au voisinage de $t_{v,r}$, qui vérifie $\mathcal{U}_{t_{v,r}}(t_{v,r}) = 1$, est la série $\sum_{i \geq 0} (-1)^i (-\alpha)_i (x - t_{v,r})^i / (i! t_{v,r}^i)$. Donc, d'après le lemme 2.2.2, on a

$$(2.5) \quad R_v(\mathcal{M}_{(\alpha/x)}, r) = \begin{cases} r \min(1, \pi_v \liminf_{i \rightarrow +\infty} |(-\alpha)_i|_v^{-1/i}) & \text{si } \alpha \in K \setminus \mathbb{Z}_{\geq 0}, \\ r & \text{si } \alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \end{cases}$$

Plus généralement, $R_v(\mathcal{M}_{(\alpha/x)}, r) \geq r\pi_v$, pour presque tout v . Cela montre, en vertu de (2.2) et (2.4), que pour toute matrice N triangulaire supérieure nilpotente à coefficients dans K , on a

$$(2.6) \quad R_v(\mathcal{M}_{\alpha/x} \otimes \mathcal{M}_{N/x}, r) \geq r\pi_v, \quad \forall r > 0, \quad \text{pour presque tout } v.$$

Par ailleurs, il est clair que $\mathcal{M}_{\alpha/x}$ n'a que des singularités régulières: 0 et l'infini. En plus, α est un exposant de $\mathcal{M}_{\alpha/x}$ en 0. Donc, si $\alpha \in K \setminus \mathbb{Q}$ et $r = 1$, le théorème 2 de [BS], joint à (2.5), montre que l'ensemble

$$\{p \in S \mid \exists v \in V_0, v|p, \liminf_{i \rightarrow \infty} |(-\alpha)_i|_v^{-1/i} = 1\}$$

a une densité de Dirichlet positive. Ce qui entraîne, d'après (2.5), que l'ensemble $\{p \in S \mid \exists v \in V_0, v|p, \forall r > 0, R_v(\mathcal{M}_{\alpha/x}, r) = r\pi_v\}$ a aussi une densité de Dirichlet positive. En combinant ceci avec (2.4), (2.2), on trouve que, pour toute matrice N triangulaire supérieure nilpotente à coefficients dans K et tout $\alpha \in K \setminus \mathbb{Q}$, l'ensemble $\{p \in S \mid \exists v \in V_0, v|p, \forall r > 0, R_v(\mathcal{M}_{\alpha/x} \otimes \mathcal{M}_{N/x}, r) = r\pi_v\}$ a une densité de Dirichlet positive.

Cette observation, jointe à (2.6) et à (2.3), permet d'affirmer que, pour toute matrice carrée J sous forme de Jordan, à coefficients dans K , ayant au moins une valeur propre irrationnelle, l'ensemble $\{p \in S \mid \exists v \in V_0, v|p, \forall r > 0, R_v(\mathcal{M}_{J/x}, r) = r\pi_v\}$ a une densité de Dirichlet positive.

Dans le cas général, soit A une matrice $n \times n$ à coefficients dans $K(x)$. Supposons que $\mathcal{M}_A$ est régulier en 0 avec au moins un exposant irrationnel. Donc, d'après §2.2, il existe une matrice carrée $Y_A \in \text{GL}_n(K((x)))$, telle que $Y_A[A]$ est sous forme de Jordan et telle que $R_v(Y_A)$ est strictement positif pour tout $v \in V_0$. Ceci implique, d'après ce qui précède joint à (2.1) et le fait que $A \in \text{M}_n(\mathcal{H}_v(]0, 1[))$ pour presque tout v , que l'ensemble $\{p \in S \mid \exists v \in V_0, v|p, \forall 0 < r < R_v(Y_A), R_v(\mathcal{M}_A, r) = r\pi_v\}$ a une densité de Dirichlet positive. Par suite, le lemme résulte du fait que la fonction $\rho \mapsto \log(R_v(\mathcal{M}_A, \exp(\rho)))$ est concave sur $]0, 1[$ pour presque tout v . $\square$

Corollaire 2.3.3. *Soit $\psi \in K(x)[d/dx]$ un opérateur différentiel régulier en 0. Supposons qu'il existe une famille de nombres réels $\{r_v\}_{v \in V_0}$ de $]0, 1]$ telle que $\prod_{v \in V_0} R_v(\psi, r_v) r_v^{-1} \neq 0$. Alors les exposants de ψ en 0 sont tous rationnels.*

Preuve. Ce corollaire résulte du lemme 2.3.2 et du fait que pour tout sous-ensemble $S' \subseteq S$ non vide de densité de Dirichlet positive on a $\prod_{p \in S'} p^{-1/(p-1)} = 0$. $\square$

2.4 Principe de transfert généralisé

Le résultat ci-dessous fournit, dans le cas non soluble, une comparaison du rayon de convergence générique et du rayon de convergence d'une matrice de réduction en un point régulier (cf. [MR, 2]):

Théorème 2.4.1. *Soient $v \in V_0$, $p = p(v)$ et ϕ un opérateur différentiel de $K(x)[d/dx]$ d'ordre n , régulier en 0 avec exposants dans $\mathbb{Z}_p$ dont les différences ne sont pas des nombres de Liouville. Soient $Y_\phi \in \mathrm{GL}_n(K[[x]])$ une matrice de réduction de ϕ en 0, $r > 0$ un nombre réel strictement positif, et β_v la plus petite pente du graphe $\mathcal{P}_v$ au-dessus de l'intervalle $] -\infty, \log r]$. Supposons que ϕ n'ait pas de singularité dans le disque épointé $D_v(0, r^-) \setminus \{0\}$ de $\mathbb{C}_p$ et que $R_v(Y_\phi) < r$. Alors*

$$(R_v(Y_\phi) r^{-1})^{1/n} \geq R_v(\phi, r) r^{-1} \geq (R_v(Y_\phi) r^{-1})^{1-\beta_v}.$$

Notons que, sous ces conditions, le principe de transfert de Christol signifie que $R_v(Y_\phi) = \sup\{0 < \rho < r \mid R_v(\phi, \rho) = \rho\}$. D'autre part, puisque Y_ϕ est une matrice de réduction de ϕ , alors $x^m Y_\phi$ l'est aussi pour tout entier $m \in \mathbb{Z}$. Donc on peut remplacer la condition $Y_\phi \in \mathrm{GL}_n(K[[x]])$ du théorème par $Y_\phi \in \mathrm{GL}_n(K((x)))$. Puisque ϕ n'a pas de singularité dans $D_v(0, r^-) \setminus \{0\}$ de $\mathbb{C}_p$, le polygone $\mathcal{P}_v$ est alors concave sur $] -\infty, \log r]$. Donc on a $\beta_v < 1$, ce qui est conséquent avec la borne inférieure du théorème.

En combinant les théorèmes 2.3.1 et 2.4.1, on obtient:

Théorème 2.4.2. *Soient ϕ un opérateur de $K(x)[d/dx]$ d'ordre n , régulier en 0 à exposants rationnels et $(r_v)_{v \in V_0}$ une famille de nombres réels de $]0, 1]$. Soit $Y_\phi \in \mathrm{GL}_n(K((x)))$ une matrice de réduction de ϕ en 0. Alors*

$$\prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_\phi) r_v^{-1}, 1) \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \prod_{v \in V_0} R_v(\phi, r_v) r_v^{-1} \neq 0.$$

Preuve. Soit V_1 l'ensemble de toutes les places $v \in V_0$ pour lesquelles d'une part, tous les exposants en 0 sont dans $\mathbb{Z}_{p(v)}$ et d'autre part les singularités finies non nulles ont la valeur

absolue v -adique 1. Soit V_2 l'ensemble de toutes les places $v \in V_1$ pour lesquelles $R_v(Y_\phi) \geq r_v$, et soit β la borne inférieure de l'ensemble des pentes des polygones de convergence de ϕ associés aux différentes places de V_0 (dans ce cas $\beta < 1$). Donc nécessairement, $V_0 - V_1$ est un ensemble fini, ϕ n'a pas de singularités dans le disque ouvert épointé $D(0, r_v^-) \setminus \{0\}$ de $\mathbb{C}_{p(v)}$ pour tout $v \in V_1$ et ϕ vérifie le principe de transfert Christol pour tout $v \in V_2$. Ce qui entraîne $R_v(\phi, r_v) = r_v$ pour tout $v \in V_0$. Par ailleurs, d'après le théorème 2.4.1, on a, pour tout $v \in V_1 - V_2$,

$$(R_v(Y_\phi)r_v^{-1})^{1/n} \geq R_v(\phi, r_v)r_v^{-1} \geq (R_v(Y_\phi)r_v^{-1})^{1-\beta}.$$

Donc

$$\prod_{v \in V_1} R_v(\phi, r_v)r_v^{-1} = \prod_{v \in V_1 - V_2} R_v(\phi, r_v)r_v^{-1} \geq \prod_{v \in V_1 - V_2} (R_v(Y_\phi)r_v^{-1})^{1-\beta} = \prod_{v \in V_1} \min(R_v(Y_\phi)r_v^{-1}, 1)^{1-\beta},$$

et

$$\prod_{v \in V_1} \min(R_v(Y_\phi)r_v^{-1}, 1) = \prod_{v \in V_1 - V_2} R_v(Y_\phi)r_v^{-1} \geq \prod_{v \in V_1 - V_2} (R_v(\phi, r_v)r_v^{-1})^n = \prod_{v \in V_1} (R_v(\phi, r_v)r_v^{-1})^n.$$

Par conséquent, le théorème résulte du fait que $V_0 - V_1$ est fini et que, pour tout $v \in V_0$, on a $R_v(Y_\phi) > 0$ et $R_v(\phi, r_v) > 0$. $\square$

2.5 Polygone de Newton-Ramis[Ra], [Ma, V.1]

Soit $\phi = \sum_{i=0}^m a_i(x) \left(\frac{d}{dx}\right)^i = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_{i,j} x^j \left(\frac{d}{dx}\right)^i \in K[x, \frac{d}{dx}]$ un opérateur différentiel

d'ordre m . Le polygone de Newton au sens de Ramis de ϕ , qu'on notera $NR(\phi)$, est l'enveloppe convexe, dans le plan uv , des demi-droites horizontales

$$\{u \leq i, v = j - i \mid a_{i,j} \neq 0\}.$$

A partir de cette définition, on constate que le côté vertical de $NR(\phi)$ est le segment $[(m, \text{ord}_x(a_m) - m), (m, \text{deg}(a_m) - m)]$. D'où, si $NR(\phi)$ n'a pas de côté vertical (autrement dit, si a_m est un monôme), alors ϕ n'a pas de singularité finie non nulle. Aussi, on observe que $NR(\phi)$ est stable par homothétie (c'est-à-dire, par le changement de variable $x \mapsto \tau x$ où $\tau \in K \setminus \{0\}$).

La partie de $NR(\phi)$ située dans le demi-plan $\{v \leq \text{ord}_x(a_m) - m\}$ est le polygone de Newton classique $N(\phi)$ de ϕ . Le polygone $N(\phi)$ peut être décrit, à une translation verticale près, en considérant ϕ comme un opérateur différentiel de $K((x))[xd/dx]$ (cf. [Ba, 2], [VS, 3.3]). On vérifie que $N(\phi)$, à une translation verticale près, ne dépend que de $\mathcal{M}_\phi$. On le note aussi $N(\mathcal{M}_\phi)$.

Quant à la partie située dans le demi-plan $\{v \leq \deg(a_m) - m\}$, elle correspond, à une translation près, au transformé par symétrie $(u, v) \longrightarrow (u, -v)$ du polygone de Newton de $\mathcal{M}_\phi$ en l'infini, c'est à dire de $N(\mathcal{M}_\phi^\infty)$.

La plus grande (resp. petite) pente finie de $NR(\phi)$ est l'**invariant de Katz** de ϕ en 0 (resp. en l'infini mais avec un signe opposé) [De, II.1.9].

L'opérateur ϕ est régulier en 0 si et seulement si les pentes finies de $NR(\phi)$ sont ≤ 0 . Il est régulier en l'infini si et seulement si les pentes finies de son polygone sont ≥ 0 (cf. [Ma, III.1]).

Lemme 2.5.1. *Soient $a_0(x), \dots, a_m(x) \in K[x]$. Les opérateurs différentiels*

$$\phi = \sum_{i=0}^m a_i(x) \left(x \frac{d}{dx} \right)^i \quad \text{et} \quad \phi_\alpha = \sum_{i=0}^m a_i(x) \left(x \frac{d}{dx} - \alpha \right)^i$$

ont le même polygone de Newton-Ramis.

Preuve. La formule

$$\phi_\alpha = \sum_{i=0}^m a_i(x) \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} (-\alpha)^{i-j} \left(x \frac{d}{dx} \right)^j = x^m a_m(x) \left(\frac{d}{dx} \right)^m + (\text{des termes d'ordres inférieurs})$$

montre que $NR(\phi)$ et $NR(\phi_\alpha)$ ont le même côté vertical s'il existe. On note aussi que $\mathcal{M}_{\phi_\alpha} \simeq \mathcal{M}_\phi \otimes_{K(x)} \mathcal{M}_\alpha$. Comme $\mathcal{M} \otimes_{K(x)} \mathcal{M}_\alpha$ est régulier en 0 pour tout module $\mathcal{M}$ régulier en 0 (cf. [De, II.1.13]), on en déduit grâce au théorème de décomposition [VS, 3.54] (voir aussi [Ma, III.1.2, III.1.5], [VS, 3.55]) que les polygones de Newton $N(\phi_\alpha)$ de ϕ_α et $N(\phi)$ de ϕ sont identiques à une translation verticale près. Or ces deux polygones ont le même point extrémal droite de coordonnées $(m, \text{ord}_x(a_m(x)) - m)$. Donc ces polygones coïncident. De même, en utilisant le fait que $\mathcal{M}_{\phi_\alpha}^\infty \simeq \mathcal{M}_\phi^\infty \otimes_{K(x)} \mathcal{M}_{-\alpha}$ et que les polygones $N(\mathcal{M}_{\phi_\alpha}^\infty)$ et $N(\mathcal{M}_\phi^\infty)$ ont le même point extrémal droite de coordonnées $(m, \deg(a_m(x)) - m)$, on démontre que les polygones $N(\mathcal{M}_{\phi_\alpha}^\infty)$ et $N(\mathcal{M}_\phi^\infty)$ coïncident. Par conséquent, ϕ et ϕ_α ont le même polygone de Newton-Ramis. $\square$

2.6 Transformation de Fourier-Laplace généralisée

Dans ce paragraphe, on introduit le K -automorphisme $\mathcal{F}_\tau$ de $K[x, d/dx]$, par rapport à l'élément τ de $K \setminus \{0\}$, définit par :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_\tau : K[x, d/dx] &\longrightarrow K[x, d/dx] \\ x &\longmapsto -\frac{1}{\tau} \frac{d}{dx} \\ \frac{d}{dx} &\longmapsto \tau x. \end{aligned}$$

Il est clair que $\mathcal{F}_\tau = H_\tau \circ \mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_1 \circ H_{1/\tau}$, où H_τ est l'homothétie définie par $H_\tau(x) = \tau x$. L'inverse de $\mathcal{F}_\tau$, que l'on note $\overline{\mathcal{F}_\tau}$, n'est autre que $H_{-1} \circ \mathcal{F}_\tau = \mathcal{F}_\tau \circ H_{-1}$. Pour $\tau = 1$, on retrouve la transformée de Fourier-Laplace classique $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1$.

Soient p un nombre premier fixé et π un nombre algébrique tel que $\pi^{p-1} = -p$. Si $\pi \in K$, le K -automorphisme $\mathcal{F}_\pi$ n'est autre que la transformée de Fourier-Laplace normalisée de Dwork.

Vu que le polygone de Newton-Ramis est stable par homothétie, le lemme 1.2 Chap.V de [Ma], peut s'étendre au cas de $\mathcal{F}_\tau$:

Lemme 2.6.1. *Soient $\phi \in K[x, d/dx]$ et $\tau \in K \setminus \{0\}$. Alors $NR(\mathcal{F}_\tau(\phi))$ est l'image de $NR(\phi)$ sous la transformation*

$$(u, v) \mapsto (u + v, -v).$$

En particulier, pour toute pente t (finie ou infinie) de $NR(\phi)$, le nombre $-t/(1+t)$ est une pente de $NR(\mathcal{F}_\tau(\phi))$.

Corollaire 2.6.2. *Soit $\tau \in K \setminus \{0\}$. Un opérateur $\phi \in K[x, d/dx]$ est régulier en 0 et en l'infini si et seulement si les pentes de $NR(\mathcal{F}_\tau(\phi))$ appartiennent à $\{-1, 0\}$. Dans ce cas, il existe un entier $\ell \in \mathbb{Z}$ tel que $x^\ell \mathcal{F}_\tau(\phi)$ peut s'écrire sous la forme $x^\ell \mathcal{F}_\tau(\phi) = \left(x \frac{d}{dx}\right)^m + a_{m-1} \left(x \frac{d}{dx}\right)^{m-1} + \dots + a_0 \in K[x, x \frac{d}{dx}]$.*

Cette dernière remarque découle du fait que $\mathcal{F}_\tau(\phi)$ est régulier en 0 et ne possède pas de singularité finie non nulle.

3. E -FONCTIONS ET E -OPÉRATEURS

3.1 E -fonctions

Rappelons qu'une série de $\sum_{n \geq 0} a_n x^n \in \overline{\mathbb{Q}}[[x]]$ est dite holonome si elle est solution d'un opérateur différentiel de $\overline{\mathbb{Q}}[x, d/dx]$. Les coefficients d'une telle série vérifient une relation de récurrence de la forme $\sum_{0 \leq i \leq \ell} P_i(n+i) a_{n+i} = 0$, pour tout entier $n \geq 0$ où les $P_0, \dots, P_\ell$

désignent des polynômes à coefficients algébriques. Cela veut dire que tous les coefficients a_n appartiennent à une extension finie de $\mathbb{Q}$.

Dans ce qui suit, on s'intéressera juste aux séries Gevrey arithmétiques holonomes. Pour cela, on supposera que le corps de nombres K contienne tous les coefficients des séries Gevrey arithmétiques holonomes qu'on rencontrera par la suite. L'ensemble des séries Gevrey arithmétiques d'ordre $s \in \mathbb{Q}$ à coefficients dans K sera noté $K\{x\}_s$.

Lemme 3.1.1. (1) Si g est une G -fonction, alors $\prod_{v \in V_0} \min(r_v(g), 1) \neq 0$.

(2) Soit $s \in \mathbb{Q}$. Les sommes finies $\sum_{\alpha, k} \lambda_{\alpha, k} y_{\alpha, k} x^\alpha \log^k x$, où les $\alpha \in \mathbb{Q}, k \in \mathbb{N}, \lambda_{\alpha, k} \in K$ et les $y_{\alpha, k} \in K\{x\}_s$, forment une $K[x]$ -algèbre différentielle que l'on note $NGA\{x\}_s$.

(cf. [A1, p126]), [A2, 1.4, 2.1]).

En combinant ce lemme avec le lemme 2.2.2, on trouve :

Corollaire 3.1.2. Si F est une E -fonction, alors $\prod_{v \in V_0} \min(r_v(F)\pi_v^{-1}, 1) \neq 0$.

3.2 G -opérateurs

Les G -opérateurs possèdent aussi une caractérisation p -adique dite “local Bombieri”, équivalente à la condition “Bombieri”, que nous donnons ici au voisinage de l'infini:

Proposition 3.2.1. Soit ϕ un opérateur différentiel de $K(x)[d/dx]$ d'ordre m , ayant une singularité régulière en l'infini avec exposants rationnels. Alors les conditions suivantes sont équivalentes

- (1) $\prod_{v \in V_0} R_v(\phi, 1) \neq 0$.
- (2) ϕ possède une matrice de réduction en l'infini $Y_\phi \in \text{GL}_m(K((x)))$ telle que $\prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_\phi), 1) \neq 0$.

Preuve. Cette proposition découle du théorème 2.4.2, et de la remarque suivante: □

Remarque 3.2.2. Si ϕ^∞ désigne l'opérateur obtenu à partir d'un opérateur ϕ de $K(x)[d/dx]$ par le changement de variable $x \rightarrow 1/x$, alors on vérifie aisément que $R_v(\phi^\infty, r^{-1}) = R_v(\phi, r)r^{-2}$, pour tout $r > 0$ et tout $v \in V_0$.

3.3 E -opérateurs

Il résulte de la définition des E -opérateurs et des propriétés des G -opérateurs qu'un produit $\psi.\psi'$ de E -opérateurs est un E -opérateur, que tout diviseur à droite d'un E -opérateur est un E -opérateur et que toute paire de E -opérateurs possède un multiple à gauche commun qui est un E -opérateur. De même que pour les G -opérateurs, si ψ est un E -opérateur, alors ψ^* et $\overline{\psi}$ sont aussi des E -opérateurs (cf. [A2, 4.1]).

Lemme 3.3.1. *Soit $\psi \in K[x, d/dx]$ un E -opérateur. Alors $x^\ell \psi$ est un E -opérateur pour tout entier ℓ tel que $x^\ell \psi \in K[x, d/dx]$.*

Cela découle du fait que, Si $\ell < 0$, L'opérateur $x^\ell \psi$ est un diviseur à gauche de ψ , tandis que, si $\ell > 0$, cet opérateur est le produit des deux E -opérateurs x^ℓ et ψ .

A partir du théorème ci-dessous dû à Y. André (cf. [A2, 4.3]), on va pouvoir démontrer que les E -opérateurs possèdent des propriétés analogues aux propriétés “local Galochkin”, “Local Bombieri” et “Bombieri” des G -opérateurs.

Théorème 3.3.2. *Soit ψ un E -opérateur d'ordre m , alors :*

- (1) *toutes les pentes de $NR(\psi)$ sont dans $\{-1, 0\}$, en particulier ψ n'a pas de singularité finie non nulle;*
- (2) *ψ est régulier en 0 avec exposants rationnels;*
- (3) *ψ admet une base de solutions en 0 de la forme $(F_1, \dots, F_m)x^{\Gamma_0}$ où les F_i sont des E -fonctions, et Γ_0 désigne une matrice carrée d'ordre m triangulaire supérieure à coefficients dans $\mathbb{Q}$;*
- (4) *ψ admet une base de solutions en l'infini de la forme*

$$\left(f_1\left(\frac{1}{x}\right), \dots, f_m\left(\frac{1}{x}\right)\right) \left(\frac{1}{x}\right)^{\Gamma_\infty} . e^{-\Delta x}$$

où les f_i sont des éléments de $K\{x\}_1$, où Δ est une matrice diagonale ayant pour coefficients diagonaux les singularités de $\overline{\mathcal{F}}(\psi)$, et où Γ_∞ désigne une matrice carrée triangulaire supérieure à coefficients dans $\mathbb{Q}$, qui commute à Δ .

Ce théorème montre que tout E -opérateur possède une base de solutions en 0 à coefficients dans $NGA\{x\}_{-1}$.

Corollaire 3.3.3. *Soient $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\alpha \in \mathbb{Q}$ et $\psi = \sum_{i=0}^m a_i(x) \left(x \frac{d}{dx}\right)^i \in K[x, x \frac{d}{dx}]$ avec*

$a_m(x) = 1$. Alors, ψ est un E -opérateur si et seulement si $\psi_\alpha := \sum_{i=0}^m a_i(x) \left(x \frac{d}{dx} - \alpha\right)^i$ est un E -opérateur.

Preuve. Supposons que ψ est un E -opérateur. D'après le théorème ci-dessus, ψ possède une base de solutions $(\zeta_1, \dots, \zeta_m)$ à coefficients dans $NGA\{x\}_{-1}$. Puisque $\psi x^{-\alpha} = x^{-\alpha} \psi_\alpha$, on en déduit que $(\zeta_1, \dots, \zeta_m)x^\alpha$ est une base de solutions de ψ_α à coefficients dans $NGA\{x\}_{-1}$. Donc en vertu de [A2, 6.1], il existe des E -opérateurs ψ_i tels que $\psi_i(\zeta_i x^\alpha) = 0$, pour $i = 1, \dots, m$. De plus, ces opérateurs admettent un multiple commun à gauche ψ_0 d'ordre $n \geq m$, qui est aussi, d'après §3.3, un E -opérateur. Par ailleurs, et grâce au lemme 3.3.1, il existe un entier $\ell \in \mathbb{Z}$ tel que $x^\ell \psi_0$ est un E -opérateur qui appartient à $K[x, x \frac{d}{dx}]$. D'autre part, puisque $a_m(x) = 1$, il existe $P, Q \in K[x, x \frac{d}{dx}]$ tels que $x^\ell \psi_0 = P\psi_\alpha + Q$ et $\text{ord}(Q) < \text{ord}(\psi_\alpha) = m$. Or, pour $i = 1, \dots, m$, on a $\psi_0(\zeta_i x^\alpha) = 0$. On en déduit que $Q = 0$, c'est-à-dire que $x^\ell \psi_0 = P\psi_\alpha$. Donc ψ_α est un diviseur à droite d'un E -opérateur et, par conséquent, il est aussi un E -opérateur d'après §3.3. La réciproque découle du fait que $(\psi_\alpha)_{-\alpha} = \psi$. $\square$

4. CONDITIONS NÉCESSAIRES

Le théorème 3.3.2 montre que la condition (1) du théorème 1.1 est nécessaire. Dans cette section on démontrera que la deuxième condition l'est aussi.

Lemme 4.1. *Soient $\mathcal{M}$ un $K(x)$ -module différentiel régulier en 0 et $A \in M_m(K(x))$ une matrice associée. Soient Y et Z deux matrices de réduction de A en 0 dans $GL_m(K((x)))$. Alors il existe une extension finie K' de K et une matrice $L \in GL_m(K'[x, 1/x])$ telle que $Y = LZ$.*

Preuve. Par définition, on a :

$$Y[A] = \frac{1}{x} \Gamma_1, \quad Z[A] = \frac{1}{x} \Gamma_2 \quad \text{avec} \quad \Gamma_1, \Gamma_2 \in M_m(K).$$

Posons $L = YZ^{-1}$. On en déduit,

$$L\left[\frac{1}{x} \Gamma_2\right] = \frac{1}{x} \Gamma_1 \quad \text{c'est-à-dire} \quad x \frac{d}{dx} L = \Gamma_1 L - L \Gamma_2.$$

Donc, si on écrit $L = \sum_{i \in \mathbb{Z}} L_i x^i$, on trouve pour tout $i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

$$i L_i = \Gamma_1 L_i - L_i \Gamma_2.$$

Or les valeurs propres de l'application

$$\begin{aligned} T_i : M_m(K) &\longrightarrow M_m(K) \\ X &\longmapsto \Gamma_1 X - X \Gamma_2 - iX \end{aligned}$$

sont $\{\lambda - \gamma - i\}$ (où les λ et γ sont respectivement des valeurs propres de Γ_1 et de Γ_2). Donc, sauf peut-être pour un nombre fini d'entiers i , cette application est inversible. Par conséquent, L_i est nul à l'exception d'un nombre fini d'entiers i . La conclusion suit. $\square$

On pourra toujours supposer que K est assez grand de sorte qu'il contienne les coefficients d'une éventuelle matrice L comme ci-dessus.

Lemme 4.2. *Soient A et B deux matrices de $M_m(K(x))$ associées à un $K(x)$ -module différentiel $\mathcal{M}$, et soient Y_A et Y_B respectivement deux matrices de réductions de A et B en 0. Alors,*

$$(4.1) \quad \min(R_v(Y_A), 1) = \min(R_v(Y_B), 1)$$

pour presque tout v de V_0 .

Preuve. Par hypothèse, il existe une matrice H de $GL_m(K(x))$ telle que $H[A] = B$. Donc $Y_B H$ est aussi une matrice de réduction de A en 0. D'après le lemme 4.1, il existe une matrice L de $GL_m(K[x, 1/x])$ telle que

$$(4.2) \quad Y_A = L Y_B H.$$

Par ailleurs, les coefficients de H et H^{-1} , considérés comme étant des éléments de $K((x))$, ont des rayons de convergence ≥ 1 pour presque tout v de V_0 . Donc, en vertu de (4.2) on a,

$$r_v(Y_A) \geq \min(r_v(Y_B), r_v(H), r_v(L)) \geq \min(r_v(Y_B), 1)$$

et aussi

$$r_v(Y_A^{-1}) \geq \min(r_v(Y_B^{-1}), 1),$$

pour presque tout v de V_0 . Ce qui donne

$$\min(R_v(Y_A), 1) \geq \min(R_v(Y_B), 1)$$

pour presque tout v de V_0 . L'inégalité dans l'autre sens s'obtient du fait que $Y_B = L^{-1} Y_A H^{-1}$ et la conclusion suit. $\square$

Corollaire 4.3. *Sous les hypothèses du lemme 4.2, on a les équivalences suivantes:*

$$(4.3) \quad \prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_A), 1) \neq 0 \iff \prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_B), 1) \neq 0$$

$$(4.4) \quad \prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_A)\pi_v^{-1}, 1) \neq 0 \iff \prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_B)\pi_v^{-1}, 1) \neq 0$$

Preuve Ces équivalences découlent de (4.1) et de la proposition 2.2.1. $\square$

Lemme 4.4. *Soit ψ un opérateur différentiel de $K[x, d/dx]$ d'ordre m , et soient $(y_1, \dots, y_m)x^{\Gamma_0}$ et $(z_1, \dots, z_m)x^{\Lambda_0}$ respectivement des bases de solutions de ψ et ψ^* en 0, où les coefficients $y_1, \dots, y_m, z_1, \dots, z_m$ appartiennent à $K[[x]]$ et où Γ_0 et Λ_0 sont des matrices $m \times m$ à coefficients dans K . Alors ψ possède une matrice de réduction $Y_\psi \in \mathrm{GL}_m(K[[x]])$ en 0 telle que les coefficients de Y_ψ (resp. de Y_ψ^{-1}) soient des combinaisons $K[x, 1/x]$ -linéaires de $z_1, \dots, z_m$ (resp. $K[x]$ -linéaires de $y_1, \dots, y_m$) et de leurs dérivées.*

Preuve. Écrivons $\psi = \sum_{i=0}^m a_i(x) \left(\frac{d}{dx}\right)^i \in K[x, \frac{d}{dx}]$. Comme $(y_1, \dots, y_m)x^{\Gamma_0}$ est une base de solutions de ψ en 0, la matrice wronskienne W de $(y_1, \dots, y_m)x^{\Gamma_0}$ est solution du système $dX/dx = A_\psi X$. De plus, il existe un entier m pour lequel W peut s'écrire sous la forme $Y_0 x^\Gamma$ où $\Gamma = \Gamma_0 + m\mathbb{I}_m$ et où Y_0 est une matrice de $\mathrm{GL}_m(K[[x]])$ dont les coefficients sont des combinaisons $K[x]$ -linéaires de $y_1, \dots, y_m$ et de leurs dérivées. Alors on a, $Y_0^{-1}[A_\psi] = \Gamma/x$, ce qui veut dire que Y_0^{-1} est une matrice de réduction de ψ en 0, ou encore que

$$(4.5) \quad {}^t Y_0 [-{}^t A_\psi] = -{}^t \Gamma \frac{1}{x}.$$

Par ailleurs, le m -uplet $a_m(x)(z_1, \dots, z_m)x^{\Lambda_0}$ est une base de solutions de $\psi^* a_m^{-1} = (a_m^{-1}\psi)^*$ en 0. Donc, la matrice U dont les lignes $u_1, \dots, u_m$ sont définies par les relations

$$\begin{aligned} u_m &= a_m(x)(z_1, \dots, z_m)x^{\Lambda_0} \\ u_{m-i} &= \frac{a_{m-i}(x)}{a_m(x)} u_m - \frac{d}{dx} u_{m-i+1} \quad (1 \leq i \leq m-1), \end{aligned}$$

est une solution du système $dX/dx = -{}^t A_\psi X$. De plus, U peut s'écrire sous la forme Zx^{Λ_0} , où Z est une matrice inversible $m \times m$ dont les coefficients sont des combinaisons $K[x, 1/x]$ -linéaires de $z_1, \dots, z_m$ et de leurs dérivées. Donc, on a

$$(4.6) \quad Z^{-1}[-{}^t A_\psi] = \frac{1}{x} \Lambda_0.$$

Par conséquent, d'après les formules (4.5), (4.6) et le lemme 4.1, il existe une matrice $L \in \mathrm{GL}_m(K[x, 1/x])$ telle que ${}^t Y_0 = LZ^{-1}$. Par suite, les éléments de Y_0^{-1} sont des combinaisons $K[x, 1/x]$ -linéaires de $z_1, \dots, z_m$ et de leurs dérivées. La matrice $Y_\psi := Y_0^{-1}$ possède donc toutes les propriétés annoncées. $\square$

Théorème 4.5. *Soit ψ un E -opérateur de $K[x, d/dx]$ d'ordre m , alors :*

- (1) ψ possède une matrice de réduction $Y_\psi \in \mathrm{GL}_m(K((x)))$ en 0 telle que les coefficients de Y_ψ et Y_ψ^{-1} sont des E -fonctions;
- (2) $\prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_\psi)\pi_v^{-1}, 1) \neq 0$;
- (3) $\prod_{v \in V_0} R_v(\psi, \pi_v)\pi_v^{-1} \neq 0$.

Preuve. (1) résulte du théorème 3.3.2 et des lemmes 3.1.1 et 4.4.

(2) Écrivons $Y_\psi = (y_{ij})_{ij}$ et $Y_\psi^{-1} = (\tilde{y}_{kl})_{kl}$. On a

$$\begin{aligned} \min(R_v(Y_\psi)\pi_v^{-1}, 1) &= \min(\min_{i,j} (r_v(y_{ij})\pi_v^{-1}), \min_{k,l} (r_v(\tilde{y}_{kl})\pi_v^{-1}), 1) \\ &\geq \prod_{ij} \min(r_v(y_{ij})\pi_v^{-1}, 1) \prod_{kl} \min(r_v(\tilde{y}_{kl})\pi_v^{-1}, 1) \end{aligned}$$

et, grâce à (1) et le corollaire 3.1.2, on obtient

$$\prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_\psi)\pi_v^{-1}, 1) \geq \prod_{ij} \prod_{v \in V_0} \min(r_v(y_{ij})\pi_v^{-1}, 1) \prod_{kl} \prod_{v \in V_0} \min(r_v(\tilde{y}_{kl})\pi_v^{-1}, 1) \neq 0.$$

L'assertion (3) se déduit de (2) et du théorème 2.4.2. $\square$

Un opérateur ψ de $K[x, d/dx]$ qui n'a pas de singularité finie non nulle et qui remplit la condition (2) du théorème ci-dessus n'est pas nécessairement un E -opérateur comme le montre l'exemple suivant :

Exemple 4.6. Soit $\psi = xd/dx - a - bx^2$ avec $a, b \in \mathbb{Q} - \{0\}$. D'une part, ψ possède seulement deux singularités : le point 0, qui est régulier d'exposant a , et l'infini qui est irrégulier. D'autre part, la fonction $Y = \exp(bx^2/2)$ est une matrice de réduction de ψ en 0, puisque $Y \left[(a + bx^2)/x \right] = a/x$. De plus, on trouve $R_v(Y) = (|2b^{-1}|_v \pi_v)^{1/2}$ pour toute place v de V_0 . Donc, d'après le théorème 2.4.2, on a $\prod_{v \in V_0} R_v(\psi, \pi_v)\pi_v^{-1} \neq 0$. Cependant, l'invariant de Katz de ψ en l'infini est égal à 2. Donc, -2 est une pente de $NR(\psi)$. Par suite, ψ n'est pas un E -opérateur.

5. TRANSFORMATION DE LAPLACE FORMELLE GÉNÉRALISÉE

Fixons d'abord un plongement de K dans $\mathbb{C}$ et un nombre $\lambda \in K \setminus \mathbb{Z}$. Pour tout $i \in \mathbb{Z}$ tel que la partie réelle de $\lambda + i$ soit > -1 , la transformée de Laplace (au sens complexe) du monôme $x^{\lambda+i}$ est donnée par

$$\mathcal{L}(x^{\lambda+i}) = \Gamma(\lambda + i + 1)x^{-\lambda-i-1} = \Gamma(\lambda)(\lambda)_i x^{-\lambda-i-1},$$

où $(\lambda)_i = \lambda(\lambda+1)\cdots(\lambda+i-1)$ est un élément de $K \setminus \{0\}$. Le produit $\Gamma(\lambda)^{-1}\mathcal{L}$ s'étend donc naturellement en un opérateur de $x^\lambda K[[x]]$ dans $x^{-\lambda-1}K[[1/x]]$. Plus généralement, étant donné $\lambda \in K \setminus \mathbb{Z}$ et $\tau \in \overline{\mathbb{Q}} \setminus \{0\}$, on définit

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_\lambda^\tau : x^\lambda K[[x]] &\longrightarrow \frac{1}{x^{\lambda+1}} K(\tau)[[1/x]] \\ \sum_{i \geq 0} a_i x^{\lambda+i} &\longmapsto \sum_{i \geq 0} a_i \frac{(\lambda)_i}{\tau^i} \frac{1}{x^{\lambda+i+1}}. \end{aligned}$$

Cet opérateur satisfait les relations, de commutation avec la dérivation d/dx , suivantes:

$$\forall f \in x^{\lambda+1}K[[x]], \quad \mathcal{L}_\lambda^\tau\left(\frac{df}{dx}\right) = \tau x \mathcal{L}_\lambda^\tau(f) \quad \text{et} \quad \mathcal{L}_\lambda^\tau(xf) = -\frac{1}{\tau} \frac{d}{dx} \mathcal{L}_\lambda^\tau(f).$$

Dans le cas où $\tau = 1$, on retrouve les relations de commutation, bien connues, de la transformée de Laplace avec d/dx .

Pour un nombre premier p fixé et un nombre algébrique $\pi \in \overline{\mathbb{Q}}$ tel que $\pi^{p-1} = -p$, on constate que l'opérateur $\mathcal{L}_\lambda^{-\pi}$ est différent de la transformation de Laplace "modifiée" de Dwork dans le cas d'une seule variable [Dw, 11.3].

Plus généralement, fixons $\tau \in K \setminus \{0\}$ et une matrice carrée Λ de format $n \times n$ dont les valeurs propres appartiennent à $K \setminus \mathbb{Z}$. Dans cette section, on généralise cette construction à des produits $A(x)x^\Lambda$ où $A(x)$ est une matrice $m \times n$ à coefficients dans $K[[x, 1/x]]$. On obtient ainsi une transformation de Laplace formelle

$$\mathcal{L}_\Lambda^\tau : x^\Lambda \text{M}_{m \times n}(K[[x, 1/x]]) \longrightarrow \frac{1}{x^{\Lambda+1}} \text{M}_{m \times n}(K[[x, 1/x]])$$

qui possède des propriétés de commutation avec la dérivation d/dx (5.4) étendant celles du cas ($m = n = 1$) ci-dessus, et qui préserve par suite la dualité entre la transformée de Laplace des fonctions et celle de Fourier-Laplace des opérateurs (Proposition 5.1). On compare aussi la couronne de convergence de la matrice $A(x)$ et celle de la partie analytique de $\mathcal{L}_\Lambda^\tau(A(x)x^\Lambda)$ (Proposition 5.2.2). Dans le cas où $m = 1$ et $A(x)x^\Lambda$ est une base de solutions logarithmiques d'un opérateur différentiel donné $\phi \in K[x, d/dx]$ en 0 (resp. en l'infini), les coefficients de $\mathcal{L}_\Lambda^\tau(A(x)x^\Lambda)$ sont des solutions logarithmiques de $\mathcal{F}_\tau(\phi)$ en l'infini (resp. en 0). Ceci permet d'avoir plus d'informations sur $\mathcal{F}_\tau(\phi)$ (exposants, rayon de convergence des coefficients des solutions logarithmiques) à partir de celles de ϕ et vice-versa. Dans le cas particulier où $\tau = 1$, on observe que cette transformation joue presque le même rôle que celui de la transformée de Laplace étendue à l'aide du calcul opérationnel [A2, 5.3]. L'avantage de cette nouvelle transformation est qu'elle ne fait pas intervenir des coefficients transcendants.

Si le nombre π , défini ci-dessus, appartient à K , il nous semble que cette nouvelle transformation sera utile pour l'étude des propriétés p -adiques de la transformée de Fourier-Laplace

normalisée de Dwork $\mathcal{F}_\pi$.

Enfin, cette transformation convient parfaitement à notre situation pour compléter la preuve du théorème principal de cet article (voir section 6).

5.1 Transformation de Laplace formelle.

Soient n un entier positif, τ un élément de $K \setminus \{0\}$ et Λ une matrice $n \times n$ à coefficients dans $\mathbb{Q}$ dont toutes les valeurs propres appartiennent à $\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ (la transformation qu'on va introduire s'étend d'une manière naturelle au cas où $\Lambda \in \mathrm{GL}_n(K)$ avec des valeurs propres dans $K \setminus \mathbb{Z}$ tout en préservant les propriétés de la proposition 5.1 ci-dessous). Soit $d \geq 1$ un dénominateur commun des valeurs propres de Λ . Alors x^Λ est une matrice de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}(x^{1/d}, \log x))$ qui satisfait

$$\frac{d}{dx}(x^\Lambda) = \Lambda x^{-1} x^\Lambda = \Lambda x^{\Lambda - \mathbb{I}_n}$$

(voir §8, chap. III de [DGS]). Pour tout entier $m \geq 1$ et toute matrice $A(x) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} A_i x^i$ de format $m \times n$ à coefficients dans $K[[x, 1/x]]$, on définit la *transformée de Laplace de $A(x)x^\Lambda$ par rapport à Λ et à τ* par

$$(5.1) \quad \mathcal{L}_\Lambda^\tau(A(x)x^\Lambda) = \mathcal{L}_\Lambda^\tau\left(\sum_{i=-\infty}^{\infty} A_i x^{\Lambda + i\mathbb{I}_n}\right) := \sum_{i=-\infty}^{\infty} A_i C_{\Lambda, \tau}(i) x^{-\Lambda - (i+1)\mathbb{I}_n}$$

où $C_{\Lambda, \tau}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}(\tau))$ est la fonction déterminée par les conditions

$$(5.2) \quad C_{\Lambda, \tau}(0) = \mathbb{I}_n \quad \text{and} \quad C_{\Lambda, \tau}(i) = \tau^{-1}(\Lambda + i\mathbb{I}_n)C_{\Lambda, \tau}(i-1), \quad (i \in \mathbb{Z}).$$

Explicitement, on a

$$C_{\Lambda, \tau}(i) = \begin{cases} \tau^{-i}(\Lambda + i\mathbb{I}_n)(\Lambda + (i-1)\mathbb{I}_n) \cdots (\Lambda + \mathbb{I}_n) & \text{si } i \geq 1, \\ \mathbb{I}_n & \text{si } i = 0, \\ \tau^{-i}\Lambda^{-1}(\Lambda - \mathbb{I}_n)^{-1} \cdots (\Lambda + (i+1)\mathbb{I}_n)^{-1} & \text{si } i \leq -1. \end{cases}$$

Grâce à ces formules, ou par récurrence sur i sur la base de (5.2), on observe que $C_{\Lambda, \tau}$ prend ses valeurs dans un sous-anneau commutatif de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}(\tau))$ et que

$$(5.3) \quad C_{\Lambda, \tau}(i)C_{-\Lambda, \tau}(-i-1) = (-1)^{i+1}\tau\Lambda^{-1}$$

pour tout $i \in \mathbb{Z}$. La transformation $\mathcal{L}_\Lambda^\tau$ possède les propriétés formelles suivantes, analogues à celle de la transformation de Laplace usuelle.

Proposition 5.1.1. *Soient m un entier positif et $A(x)$ une matrice $m \times n$ à coefficients dans $K[[x, 1/x]]$. On pose $f = A(x)x^\Lambda$. Alors, on a*

$$(5.4) \quad \mathcal{L}_{-\Lambda}^\tau(\mathcal{L}_\Lambda^\tau(f)) = -\tau A(-x)\Lambda^{-1}x^\Lambda, \quad \mathcal{L}_\Lambda^\tau\left(\frac{df}{dx}\right) = \tau x \mathcal{L}_\Lambda^\tau(f) \quad \text{et} \quad \mathcal{L}_\Lambda^\tau(xf) = -\frac{1}{\tau} \frac{d}{dx} \mathcal{L}_\Lambda^\tau(f).$$

De plus, si $m = 1$ et si les coefficients de f sont des solutions d'un opérateur différentiel $\phi \in K[x, d/dx]$, alors ceux de $\mathcal{L}_\Lambda^\tau(f)$ sont des solutions de $\mathcal{F}_\tau(\phi)$.

Preuve. Par linéarité, il suffit de démontrer (5.4) dans le cas où $f = x^i x^\Lambda = x^{\Lambda + i\mathbb{I}_n}$ avec $i \in \mathbb{Z}$. Dans ce cas, grâce à (5.2) et (5.3), on trouve bien

$$\mathcal{L}_{-\Lambda}^\tau(\mathcal{L}_\Lambda(f)) = \mathcal{L}_{-\Lambda}^\tau(C_{\Lambda,\tau}(i)x^{-\Lambda-(i-1)\mathbb{I}_n}) = C_{\Lambda,\tau}(i)C_{-\Lambda,\tau}(-i-1)x^{\Lambda+i\mathbb{I}_n} = -\tau A(-x)\Lambda^{-1}x^\Lambda,$$

$$\mathcal{L}_\Lambda^\tau\left(\frac{df}{dx}\right) = (\Lambda + i\mathbb{I}_n)C_{\Lambda,\tau}(i-1)x^{-\Lambda-i\mathbb{I}_n} = \tau C_{\Lambda,\tau}(i)x^{-\Lambda-i\mathbb{I}_n} = \tau x \mathcal{L}_\Lambda^\tau(f),$$

$$\mathcal{L}_\Lambda^\tau(xf) = C_{\Lambda,\tau}(i+1)x^{-\Lambda-(i+2)\mathbb{I}_n} = \frac{1}{\tau}C_{\Lambda,\tau}(i)(\Lambda + (i+1)\mathbb{I}_n)x^{-\Lambda-(i+2)\mathbb{I}_n} = -\frac{1}{\tau}\frac{df}{dx}\mathcal{L}_\Lambda^\tau(f).$$

Enfin, les formules (5.4) impliquent $\mathcal{L}_\Lambda^\tau(\phi(f)) = \mathcal{F}_\tau(\phi)(\mathcal{L}_\Lambda^\tau(f))$ pour tout opérateur différentiel $\phi \in K[x, d/dx]$. La seconde assertion de la proposition s'ensuit. $\square$

5.2 Comparaison de rayons de convergence.

Soient $\Lambda \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q})$, τ et d comme au paragraphe précédent. Pour toute place v de K et toute matrice M à coefficients dans K , on désigne par $\|M\|_v$ le maximum des valeurs absolues v -adiques des éléments de M . On note d'abord le résultat suivant.

Lemme 5.2.1. *Soit v une place de K au-dessus d'un nombre premier p qui ne divise pas d . Avec la notation habituelle $\pi_v = p^{-1/(p-1)}$, on a*

$$(5.5) \quad \lim_{i \rightarrow \infty} \|C_{\Lambda,\tau}(i)\|_v^{1/i} = \pi_v |\tau|_v^{-1} \quad \text{and} \quad \lim_{i \rightarrow -\infty} \|C_{\Lambda,\tau}(i)\|_v^{1/i} = \pi_v^{-1} |\tau|_v.$$

Preuve. Puisque les valeurs propres de Λ sont toutes rationnelles, il existe $U \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q})$ telle que le produit $\Delta = U^{-1}\Lambda U$ soit sous forme de Jordan. Pour tout $i \in \mathbb{Z}$, on a $C_{\Delta,\tau} = U^{-1}C_{\Lambda,\tau}U$ et par suite le rapport $\|C_{\Lambda,\tau}(i)\|_v / \|C_{\Delta,\tau}(i)\|_v$ est majoré et minoré par des constantes positives indépendantes de i . Cela permet de supposer que Λ est elle-même sous forme de Jordan. Dans ce cas, Λ est diagonale par blocs avec des blocs de Jordan $J_1, \dots, J_s$ sur la diagonale et par suite $C_{\Lambda,\tau}(i)$ est aussi diagonale par blocs avec les blocs $C_{J_1,\tau}(i), \dots, C_{J_s,\tau}(i)$ sur la diagonale et donc $\|C_{\Lambda,\tau}(i)\|_v = \max_{1 \leq k \leq s} \|C_{J_k,\tau}(i)\|_v$. Cela permet de se ramener au cas où Λ est un bloc de Jordan. Dans ce cas, on peut écrire $\Lambda = r\mathbb{I}_n + N$ où $r \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ et où N est une matrice triangulaire supérieure nilpotente. Comme $N^n = 0$, on trouve, pour tout $i \geq 1$,

$$(5.6) \quad \begin{aligned} C_{\Lambda,\tau}(i) &= \tau^{-i} \prod_{k=1}^i ((r+k)\mathbb{I}_n + N) \\ &= \tau^{-i} (r+1)_i \left(\mathbb{I}_n + \sum_{t=1}^{n-1} \left(\sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_t \leq i} \frac{1}{(r+k_1) \cdots (r+k_t)} \right) N^t \right), \end{aligned}$$

Or, pour tout entier $k \geq 1$, la somme $r + k$ est un nombre rationnel dont la valeur absolue du numérateur (au sens usuel) est majorée par ck , pour une constante $c > 0$ qui ne dépend que de r , et dont le dénominateur est premier à p . On en déduit $|r + k|_v \geq (ck)^{-1}$ pour tout $k \geq 1$ et par suite, la décomposition (5.6) entraîne, pour tout $i \geq 1$,

$$|\tau^{-i}(r + 1)_i|_v \leq \|C_{\Lambda, \tau}(i)\|_v \leq (ci)^{n-1} |\tau^{-i}(r + 1)_i|_v,$$

la minoration découlant du fait que les éléments de la diagonale de $C_{\Lambda, \tau}(i)$ sont tous égaux à $(r + 1)_i$. Cette dernière observation livre aussi $\det C_{\Lambda, \tau}(i) = \tau^{-in}(r + 1)_i^n$. Grâce au lemme 2.2.2, on en déduit

$$(5.7) \quad \lim_{i \rightarrow \infty} \|C_{\Lambda, \tau}(i)\|_v^{1/i} = \lim_{i \rightarrow \infty} |\tau^{-i}(r + 1)_i|_v^{1/i} = \pi_v |\tau|_v^{-1},$$

ce qui démontre la première moitié de (5.5), et aussi

$$(5.8) \quad \lim_{i \rightarrow \infty} \|\det C_{\Lambda, \tau}(i)\|_v^{1/i} = \lim_{i \rightarrow \infty} |\tau^{-i}(r + 1)_i|_v^{n/i} = \pi_v^n |\tau|_v^{-n}.$$

On note par ailleurs que, pour toute matrice $A \in \mathrm{GL}_n(K_v)$, on a

$$\|A\|_v^{-1} \leq \|A^{-1}\|_v \leq |\det A|_v^{-1} \|A\|_v^{n-1}.$$

En effet, la relation $\mathbb{I}_n = AA^{-1}$ implique $1 = \|\mathbb{I}_n\|_v \leq \|A\|_v \|A^{-1}\|_v$ qui livre la première des inégalités ci-dessus. La seconde découle simplement de la formule $A^{-1} = (\det A)^{-1} \mathrm{Adj}(A)$ où $\mathrm{Adj}(A)$ désigne l'adjointe de A . Si on applique ces formules avec $A = C_{\Lambda, \tau}(i)$, on déduit de (5.7) et de (5.8) que

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \|C_{\Lambda, \tau}(i)^{-1}\|_v^{1/i} = \pi_v^{-1} |\tau|_v.$$

Cette formule s'applique aussi à $-\Lambda$ au lieu de Λ car les valeurs propres de $-\Lambda$ appartiennent aussi à $\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$. Alors, grâce à (5.3), on obtient

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \|C_{\Lambda, \tau}(-i)\|_v^{1/i} = \lim_{i \rightarrow \infty} \|\tau \Lambda^{-1} C_{-\Lambda, \tau}(i - 1)^{-1}\|_v^{1/i} = \pi_v^{-1} |\tau|_v,$$

ce qui démontre la seconde partie de (5.5). $\square$

Proposition 5.2.2. *Soient m un entier positif, v une place finie de K au-dessus d'un nombre premier qui ne divise pas d , et $A(x)$ une matrice de format $m \times n$ à coefficients dans $K_v[[x, 1/x]]$. Supposons qu'il existe des nombres réels r et R avec $0 < r \leq R$ tels que les coefficients de $A(x)$ convergent pour tout $x \in \bar{K}_v$ avec $r < |x|_v < R$ où $\bar{K}_v$ désigne une clôture algébrique de K_v . Alors, on a $\mathcal{L}_\Lambda^\tau(A(x)x^\Lambda) = B(x)x^{-\Lambda}$ où $B(x)$ est matrice de format $m \times n$ à coefficients dans $K_v[[x, 1/x]]$ dont les coefficients convergent pour tout $x \in \bar{K}_v$ avec $\pi_v |\tau|_v^{-1} R^{-1} < |x|_v < |\tau|_v \pi_v^{-1} r^{-1}$.*

Preuve. Écrivons $A(x) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} A_i x^i$ de sorte que $B(x) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} B_i x^{i-1}$ avec $B_i = A_{-i} C_{\Lambda, \tau}(-i)$ pour tout $i \in \mathbb{Z}$. L'hypothèse que les coefficients de $A(x)$ convergent en tout point x de $\bar{K}_v$ avec $r < |x|_v < R$ signifie que $\limsup_{i \rightarrow \infty} \|A_i\|_v^{1/i} \leq 1/R$ et $\limsup_{i \rightarrow \infty} \|A_{-i}\|_v^{1/i} \leq$

$1/r$. Puisque $\|B_i\|_v \leq \|A_{-i}\|_v \|C_{\Lambda, \tau}(-i)\|_v$ pour tout $i \in \mathbb{Z}$, on en déduit, grâce au lemme 5.2.1, que $\limsup_{i \rightarrow \infty} \|B_i\|_v^{1/i} \leq |\tau|_v / (r\pi_v)$ et que $\limsup_{i \rightarrow \infty} \|B_{-i}\|_v^{1/i} \leq \pi_v / (R|\tau|_v)$. La conclusion suit. $\square$

Remarque. Cette transformée de Laplace formelle pourrait avoir d'autres applications, notamment p -adiques; Nous comptons ultérieurement l'appliquer aux isocristaux surconvergents.

6. CONDITIONS SUFFISANTES

Le but de cette section est de compléter la preuve du théorème 1.1. Pour cela, on commence par établir le résultat préliminaire suivant:

Proposition 6.1. *Soit ψ un opérateur de $K[x, d/dx]$ d'ordre m , régulier en 0, ayant une matrice de réduction $Y_\psi \in \mathrm{GL}_m(K((x)))$ en 0 telle que $\prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_\psi)\pi_v^{-1}, 1) \neq 0$. Supposons que $\phi = \overline{\mathcal{F}}(\psi)$ soit d'ordre n et régulier en l'infini avec des exposants rationnels non entiers. Alors ψ est un E -opérateur.*

La preuve de cette proposition repose sur les deux lemmes suivants:

Lemme 6.2. *Sous les hypothèses de la proposition 6.1, l'opérateur ϕ possède une base de solutions en l'infini de forme $(y_1(\frac{1}{x}), \dots, y_n(\frac{1}{x}))(\frac{1}{x})^\Gamma$ telle que $y_1, \dots, y_n \in K[[x]]$, $\Gamma \in M_n(\mathbb{Q})$ et $\prod_{v \in V_0} \min(r_v(y_i), 1) \neq 0$ pour $i = 1, \dots, n$.*

Preuve. La décomposition de Turrittin-Levelt affirme que les opérateurs différentiels ϕ et ψ admettent respectivement des bases de solutions en l'infini et en 0 de la forme

$$\left(y_1\left(\frac{1}{x}\right), y_2\left(\frac{1}{x}\right), \dots, y_n\left(\frac{1}{x}\right)\right)\left(\frac{1}{x}\right)^\Gamma \quad \left(\text{resp. } (w_1, \dots, w_n) := (F_1, F_2, \dots, F_m)x^\Lambda\right)$$

telles que

- 1) $y_1, \dots, y_n, F_1, \dots, F_m \in K[[x]]$,
- 2) $\Gamma = D + N$ est une matrice carrée d'ordre n (resp. $\Lambda = \Delta + \Theta$ d'ordre m) où D (resp. Δ) est une matrice diagonale à coefficients $D_{ii} := \alpha_i$ (resp. $\Delta_{ii} := \beta_i$) qui sont les exposants de ϕ en l'infini (resp. de ψ en 0),
- 3) $N = (N_{ij})$ (resp. $\Theta = (\Theta_{ij})$) est une matrice nilpotente triangulaire supérieure à coefficients dans $\mathbb{Q}$ telle que $DN = ND$ (resp. $\Delta\Theta = \Theta\Delta$).

Comme les $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont des nombres rationnels non entiers, la proposition 5.1.1 implique que les coefficients du n -uplet

$$(6.1) \quad (\zeta_1, \dots, \zeta_n) := \mathcal{L}_{-\Gamma}^1 \left(\left(y_1(-1/x), y_2(-1/x), \dots, y_n(-1/x) \right) \left(\frac{1}{x} \right)^\Gamma \right)$$

sont des solutions de ψ en 0. De plus, le vecteur-ligne $(\zeta_1, \dots, \zeta_n)$ peut s'écrire sous la forme

$$(6.2) \quad (\zeta_1, \dots, \zeta_n) = (f_1, \dots, f_n)x^\Gamma, \quad \text{où } f_1, \dots, f_n \in K((x)).$$

Or,

$$\begin{aligned} x^\Gamma &= x^{D+N} = \exp(D \log x) \exp(N \log x) = x^D \sum_{k \geq 0} \frac{N^k}{k!} \log^k x \\ &= x^D + x^D \sum_{k=1}^n \frac{N^k}{k!} \log^k x. \end{aligned}$$

Alors,

$$(6.3) \quad \zeta_1 = f_1 x^{\alpha_1}, \text{ et } \zeta_i = f_i x^{\alpha_i} + \sum_{j=1}^{i-1} f_j x^{\alpha_j} \sum_{k=1}^n \frac{(N^k)_{ji}}{k!} \log^k x; \quad 2 \leq i \leq n,$$

car $(N^k)_{ji} = 0$ quel que soit $j \geq i$. De même on trouve

$$w_1 = F_1 x^{\beta_1}, \text{ et } w_i = F_i x^{\beta_i} + \sum_{j=1}^{i-1} F_j x^{\beta_j} \sum_{k=1}^m \frac{(\Theta^k)_{ji}}{k!} \log^k x; \quad 2 \leq i \leq m.$$

Donc,

$$\zeta_i \in \langle w_1, \dots, w_m \rangle_K \subseteq \langle F_1 x^{\beta_1}, \dots, F_m x^{\beta_m} \rangle_{K[\log x]} \quad (i = 1, \dots, n).$$

En particulier,

$$f_1 x^{\alpha_1} \in \langle F_1 x^{\beta_1}, \dots, F_m x^{\beta_m} \rangle_{K[\log x]}.$$

Et par récurrence sur i , on déduit de (6.3) que

$$f_i x^{\alpha_i} \in \left\langle F_j x^{\beta_j}, f_k x^{\alpha_k}; 0 \leq j \leq m, 1 \leq k \leq i-1 \right\rangle_{K[\log x]} \quad (i = 2, \dots, n),$$

ou encore,

$$\alpha_i \in \{\beta_j + h \mid h \in \mathbb{Z}, j = 1, \dots, m\}, \text{ et } f_i \in \langle F_1, \dots, F_m \rangle_{K[x, 1/x]}; \quad i = 1, \dots, n.$$

Ce qui entraîne que, pour toute place finie $v \in V_0$,

$$(6.4) \quad \min_{1 \leq i \leq n} r_v(f_i) \geq \min_{1 \leq j \leq m} r_v(F_j).$$

Par ailleurs, d'après le lemme 4.4, l'opérateur ψ possède une matrice de réduction Y_0 en 0 telle que les coefficients de Y_0^{-1} sont des combinaisons $K[x]$ -linéaires de $F_1, \dots, F_m$ et de leurs dérivées. Ce qui implique, en vertu du lemme 4.1, que pour toute place finie $v \in V_0$,

$$\min_{1 \leq j \leq m} r_v(F_j) \geq r_v(Y_0^{-1}) \geq R_v(Y_0^{-1}) = R_v(Y_\psi),$$

et grâce à (6.4), on obtient

$$(6.5) \quad \min_{1 \leq i \leq n} r_v(f_i) \geq R_v(Y_\psi)$$

pour toute place finie $v \in V_0$. Or, si on applique la première égalité de (5.4) sur $(y_1(\frac{1}{x}), \dots, y_n(\frac{1}{x}))(\frac{1}{x})^\Gamma$, on trouve, depuis (6.1) et (6.2),

$$\mathcal{L}_\Gamma^1((f_1, \dots, f_n)x^\Gamma) = -(y_1(-1/x), \dots, y_n(-1/x))\Gamma^{-1}(\frac{1}{x})^\Gamma.$$

Ce qui entraîne, d'après la proposition 5.2.2, $\min_{1 \leq i \leq n} r_v(y_i) \geq \min_{1 \leq i \leq n} r_v(f_i)\pi_v^{-1}$ pour presque tout $v \in V_0$. Par suite, le lemme résulte de l'hypothèse $\prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_\psi)\pi_v^{-1}, 1) \neq 0$. $\square$

Lemme 6.3. *Sous les hypothèses de la proposition 6.1, l'opérateur ϕ^* possède lui aussi une base de solutions en l'infini de forme $(z_1(\frac{1}{x}), \dots, z_n(\frac{1}{x}))(\frac{1}{x})^\Lambda$ telle que $z_1, \dots, z_n \in K[[x]]$, $\Lambda \in M_n(\mathbb{Q})$ et $\prod_{v \in V_0} \min(r_v(z_i), 1) \neq 0$ pour $i = 1, \dots, n$.*

Preuve. En vertu du lemme 6.2, il suffit de montrer que les opérateurs ϕ^* et $\overline{\psi^*}$ satisfont les hypothèses de la proposition 6.1 au lieu de ϕ et ψ . Pour cela, on note d'abord, d'après §2.2, que la matrice ${}^tY_\psi^{-1}$ est une matrice de réduction de $\mathcal{M}_{\psi^*}$ en 0. Donc, par le changement de variable $x \rightarrow -x$, l'opérateur $\overline{\psi^*}$ est régulier en 0 et $Y(x) := {}^tY_\psi^{-1}(-x)$ est une matrice de réduction de $\mathcal{M}_{\overline{\psi^*}}$ en 0 qui vérifie aussi $\prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y)\pi_v^{-1}, 1) \neq 0$. Donc, grâce au lemme 4.4, si $Y_{\overline{\psi^*}}$ désigne une matrice de réduction de $\overline{\psi^*}$ en 0, alors elle vérifie $\prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_{\overline{\psi^*}})\pi_v^{-1}, 1) \neq 0$. Par ailleurs, grâce encore à §2.2, l'opérateur ϕ^* est régulier en l'infini à exposants rationnels non entiers. Enfin, on a $\mathcal{F}(\phi^*) = (\mathcal{F}\overline{\phi})^* = \overline{\psi^*}$ (cf. [Ma, V.3.6]). $\square$

Preuve de la proposition 6.1. En combinant les lemmes 6.2 et 6.3 avec le lemme 4.4 (appliqué en l'infini), on obtient que ϕ possède une matrice de réduction Y_ϕ en l'infini telle que $\prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_\phi), 1) \neq 0$. Comme les exposants de ϕ en l'infini sont rationnels, la proposition 3.2.1 entraîne donc que ϕ est un G -opérateur et par suite ψ est un E -opérateur. $\square$

Pour compléter la preuve du théorème 1.1, il suffit, d'après §2.5, le théorème 2.4.2 et le corollaire 2.3.3, de démontrer le théorème suivant:

Théorème 6.4. *Soit $\psi \in K[x, d/dx]$ un opérateur différentiel et soit Y_ψ une matrice de réduction de ψ en 0. Supposons que ψ vérifie les conditions suivantes :*

- (1) *les pentes de $NR(\psi)$ sont dans $\{-1, 0\}$;*
- (2) *les exposants de ψ en 0 sont rationnels;*

(3) $\prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_\psi)\pi_v^{-1}, 1) \neq 0$.

Alors ψ est un E -opérateur.

La principale difficulté rencontrée pour prouver ce théorème vient du fait que l'opérateur $\phi := \overline{\mathcal{F}}(\psi)$ (régulier en l'infini d'après corollaire 2.6.2) peut admettre des exposants entiers en l'infini. Cependant, à l'aide des réductions ci-dessous, on se ramène au cas où tous les exposants de ϕ en l'infini sont rationnels non entiers et alors le théorème découle de la proposition 6.1.

Réductions

I. Tout d'abord, on remarque que, pour tout $\ell \in \mathbb{Z}$ tel que $x^\ell \psi \in K[x, d/dx]$, l'opérateur $x^\ell \psi$ vérifie les conditions du théorème. En effet, le polygone de Newton Ramis de $x^\ell \psi$ n'est autre que celui de ψ à une translation verticale près. Les conditions (2) et (3) se déduisent du fait que $A_\psi = A_{x^\ell \psi}$ et $\mathcal{M}_\psi = \mathcal{M}_{x^\ell \psi}$. Donc, d'après (1), corollaire 2.6.2 et lemme 3.3.1, il suffit de démontrer le théorème pour les opérateurs de la forme: $\psi = \sum_{i=0}^m a_i(x) \left(x \frac{d}{dx}\right)^i$, avec $a_i(x) = \sum_{j=0}^n a_{ij} x^j \in K[x]$ et $a_m(x) = 1$.

II. Maintenant, si ϕ a des exposants entiers en l'infini, on considère les opérateurs différentiels suivants déduits de ψ en fonction d'un paramètre $\alpha \in \mathbb{Q}$:

$$\begin{array}{ccccc} & & \overline{\mathcal{F}} & & \\ \phi & = & \sum_{i=0}^m a_i \left(\frac{d}{dx}\right) \left(-x \frac{d}{dx} - 1\right)^i & \xleftarrow{\quad} & \psi = \sum_{i=0}^m a_i(x) \left(x \frac{d}{dx}\right)^i \\ & & \downarrow & & \\ \alpha\phi & = & \sum_{i=0}^m a_i \left(\frac{d}{dx}\right) \left(-x \frac{d}{dx} - \alpha - 1\right)^i & \xleftarrow{\quad} & \psi_\alpha = \sum_{i=0}^m a_i(x) \left(x \frac{d}{dx} - \alpha\right)^i \\ & & \overline{\mathcal{F}} & & \end{array}$$

L'opérateur ψ_α ainsi défini partage avec ψ les propriétés suivantes.

- (1) Les pentes de $NR(\psi_\alpha)$ appartiennent à $\{-1, 0\}$.
- (2) Tous les exposants de ψ_α en 0 sont rationnels.
- (3) $\prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_{\psi_\alpha})\pi_v^{-1}, 1) \neq 0$, où Y_{ψ_α} est une matrice de réduction de ψ_α en 0.

En effet, la première assertion résulte du lemme 2.5.1. Quant aux deux dernières, on va les démontrer simultanément. La matrice

$$A = \frac{1}{x} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{m-1} \end{pmatrix}$$

est associée au $K(x)$ -module différentiel $\mathcal{M}_\psi$. En combinant les hypothèses (1) et (2) du théorème 6.4 avec les observations de §2.5, la matrice A possède une matrice de réduction $Y_A \in \mathrm{GL}_m(K((x)))$ en 0 telle que $Y_A[A] = x^{-1}\Lambda$ où Λ désigne une matrice $m \times m$ à coefficients dans K dont les valeurs propres sont dans $\mathbb{Q}$. Donc $Y_A[A + \frac{\alpha}{x}\mathbb{I}_m] = \frac{1}{x}(\Lambda + \alpha\mathbb{I}_m)$. Par conséquent, la matrice Y_A est aussi une matrice de réduction de $(A + \frac{\alpha}{x}\mathbb{I}_m)$. Or $(A + \frac{\alpha}{x}\mathbb{I}_m)$ est une matrice associée au $K(x)$ -module différentiel $\mathcal{M}_\psi \otimes_{K(x)} \mathcal{M}_\alpha = \mathcal{M}_{\psi_\alpha}$. Donc, d'une part, les exposants de ψ_α sont tous rationnels en 0. D'autre part, depuis (3) du théorème 6.4, le corollaire 4.3, appliqué à Y_ψ et Y_A ensuite à Y_A et Y_{ψ_α} , entraîne $\prod_{v \in V_0} \min(R_v(Y_{\psi_\alpha})\pi_v^{-1}, 1) \neq 0$, et la conclusion suit.

Par ailleurs, les formules suivantes

$$\begin{aligned} {}_\alpha\phi(x^{-s}) &= \sum_{i=0}^m a_i \left(-\frac{d}{dx} \right) \left(x \frac{d}{dx} - \alpha - 1 \right)^i (x^{-s}) \\ &= \sum_{i=0}^m a_{i0} x^{-s} (s - \alpha - 1)^i + (\text{termes d'ordre inférieur}), \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \psi_\alpha(x^s) &= \sum_{i=0}^m a_i(x) \left(x \frac{d}{dx} - \alpha \right)^i (x^s) \\ &= \sum_{i=0}^m a_{i0} x^s (s - \alpha)^i + (\text{termes d'ordre supérieur}), \end{aligned}$$

montrent que les polynômes indicels des opérateurs de ${}_\alpha\phi$ et ϕ en l'infini sont respectivement

$$\sum_{i=0}^m a_{i0} (s - \alpha - 1)^i \quad \text{et} \quad \sum_{i=0}^m a_{i0} (s - 1)^i,$$

et que ceux de ψ_α et ψ en 0 sont respectivement

$$\sum_{i=0}^m a_{i0} (s - \alpha)^i \quad \text{et} \quad \sum_{i=0}^m a_{i0} s^i.$$

Donc, d'une part, les exposants de ${}_\alpha\phi$ en l'infini sont ceux de ϕ en l'infini translatés par $-\alpha$, et d'autre part, les exposants de ${}_\alpha\phi$ en l'infini sont ceux de ψ_α en 0 translatés par 1. Cela montre que les exposants de ${}_\alpha\phi$ et ϕ en l'infini sont tous rationnels. De plus, comme les opérateurs ϕ et ${}_\alpha\phi$ sont réguliers en l'infini, ils ont le même ordre m que celui de ψ (cf. [Ba, §2. Remark 6]). Par conséquent, quitte à choisir un rationnel convenable α , les exposants de ${}_\alpha\phi$ en l'infini sont tous des nombres rationnels non entiers et le théorème résulte de la proposition 6.1. $\square$

REFERENCES

- [A1] Y. ANDRÉ, *G-functions and geometry*. Aspects of Mathematics E13, Vieweg Braunschweig/Wiesbaden, 1989.
- [A2] Y. ANDRÉ, *Séries Gevrey de type arithmétique (I: Théorèmes de pureté et de dualité)*. Annals of Mathematics, Vol 151, N: 2, pp 705-740 , January 2000.
- [A3] Y. ANDRÉ, *Séries Gevrey de type arithmétique (II: Transcendance sans transcendance)*. Annals of Mathematics, Vol 151, N: 2, pp 741-756 , January 2000.
- [Ba] F. BALDASSARRI, *Differential modules and singular points of p -adic differential equations*. Adv in Mathematics, pp 155-179, 1982.
- [Bo] E. BOMBIERI, *On G -functions*, Recent progress in Analytic number theory. Academic Press, pp 1-67, 1981.
- [BS] E. BOMBIERI, S. SPERBER *On the p -adic analyticity of solutions of linear differential equations*, Illinois journal of mathematics. Vol 26, N 1 pp 10-18, 1982.
- [CC] D. CHUDNOVSKY, G. CHUDNOSKY, *Applications to diophantine inequalities in values of G -functions*, in Number theory (New york 1983-84), lecture Notes in Math 1135, Springer-verlag, New York, 1985
- [CD] G. CHRISTOL, B. DWORK, *Modules différentiels sur des couronnes*. Ann. Inst. Fourier Grenoble Vol 44, N 3, pp 663-701, 1994.
- [Ch] G. CHRISTOL, *Un théorème de transfert pour les disques singuliers réguliers*. Astérisque 119-120, Société Mathématique de France, pp 151-164, 1984.
- [Cl] D. CLARK, *A note on the p -adic convergence of solutions of linear differential equations*. Proc. Am. Math. Soc 17, pp 262-269, 1966.
- [CR] G. CHRISTOL, P. ROBBA, *Equations différentielles p -adiques, Applications aux sommes exponentielles*, Actualités Mathématique, Hermann (1994).
- [De] P. DELIGNE, *Equations différentielles à points singuliers réguliers*. Lecture notes in mathematics, N:163, 1970.
- [DGS] B. DWORK, G. GEROTTO, F.J. SULLIVAN *An introduction to G -functions*. Volume 133 of Annals of Mathematics studies. Princeton University Press, Princeton 1994.
- [Dw] B. DWORK *Generalized hypergeometric functions*. Oxford University Press, New York, 1990.
- [Ka] N. KATZ, *Nilpotent connections and the monodromy theorem. Applications of a result of Turrittin*. Pub. Math. IHES 39. 1970, pp 175-232.
- [Le] A. LEVELT, *Jordan decomposition for a class of singular differential operators*. Ark. Mat. Vol 13, pp 1-27, 1975.
- [Ma] B. MALGRANGE, *Équations différentielles à coefficients polynomiaux*. Birkhauser Vol 96, 1991.
- [MR] S. MANJRA, S. REMMAL, *Rayon de convergence générique des équations différentielles à coefficients polynomiaux sur un corps de nombres*. Annales Mathématiques Blaise Pascal, Vol. 8, N 2, pp 89-105, 2001.
- [Po] E. PONS, *Polygone de convergence d'un module différentiel p -adique*. C. R. Acad. Sci. Paris, t.327, Série I, pp 77-80, 1998.
- [Ra] J.P. RAMIS, *Théorèmes d'indices Gevrey pour les équations différentielles ordinaires*. Mem. Amer. Math. Soc. 48, N 296 , 1984.
- [VS] V. D. PUT, M. F. SINGER, *Galois theory of linear differential equations*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Volume 328, Springer, 2003.

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES, UNIVERSITÉ D'OTTAWA, 585 KING EDWARD, OTTAWA, ONTARIO K1N 6N5, CANADA

E-mail address: manjra@math.net

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES, FACULTÉ DES SCIENCES DE FÈS, BP 1796. ATLAS-FÈS., FÈS. MAROC

E-mail address: Remmal@math.net